

### **3. óra – Házi feladat**

**Olvasd el a következő útmutatót, majd válaszolj a kérdésekre!**

#### **Daedalon tablettá**

Ezzel a recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás elérése érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszerek körültekintő, szakszerű alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez!
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha a tünetei két napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak!

#### **Mikor alkalmazható a Daedalon tablettá?**

Különböző eredetű hányinger és hányás megelőzésére és kezelésére szolgál, mint jármű által kiváltott utazási betegség, sugárkezelés okozta hányás, szédüléssel is járó belsőfül eredetű émelygés. Terhesség alatt jelentkező hányinger, hányás kezelésére csak az orvos kifejezett utasítására alkalmazható!

#### **Mit tartalmaz a Daedalon tablettá?**

Hatóanyag: 50,0 mg dimenhydrinatum tablettánként. Segédanyagok: magnézium-sztearát, talkum, mikrokristályos cellulóz, kolloid-szilícium-dioxid.

#### **Mikor nem alkalmazható a Daedalon tablettá?**

- A hatóanyaggal, illetve a készítmény összetevőivel szembeni túlérzékenység esetén.
- Görcsös állapotokban.
- Veseelégtelenség esetén.
- Zöldhályog esetén.
- Megnövekedett koponyaűri nyomás (pl. fejsérülés) esetén.
- Szoptatás ideje alatt.
- 6 év alatti életkor esetén.

#### **Mit kell tudni a kezelés megkezdése előtt?**

Feltétlenül kérjen tanácsot orvosától:

- a következő betegségek fennállása esetén: emelkedett szemelnyomás, vizeletürítési zavarok, asztma, magas vérnyomás, súlyos koszorúér-betegség, vese- és májelégtelenség,
- ha más gyógyszert is szed, különös tekintettel az alábbi gyógyszerekre: altatók, nyugtatók és egyéb pszichiátriai gyógyszerek, Parkinson-kór elleni gyógyszerek, görcsoldók, egyes antibiotikumok.

## **A Daedalon tableta szedésekor ne fogyasszon alkoholt!**

### **Milyen hatása van a Daedalon tablettának a gépjárművezetésre, baleseti veszéllyel járó munka végzésére?**

A gyógyszer szedése álmatlanságot, bágyadtságot, szédülést, a reakcióidő megnövekedését okozhatja, ezért ezen tünetek jelentkezésekor gépjárművet vezetni és baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos.

### **Hogyan kell szedni a Daedalon tablettát?**

Felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek: 4–6 óránként 1–2 tableta, a legnagyobb napi adag 8 tableta.

6-12 éves gyermeknek: naponta 2–3-szor  $\frac{1}{2}$ –1 tableta (összesen napi 5mg/testsúlykilogramm). Utazási betegség megelőzésére az első adagot az utazás megkezdése előtt fél órával kell bevenni. Amennyiben a tünetek a gyógyszereszedés ellenére két nap után is fennállnak, illetve egyéb tünetek is jelentkeznek, azonnal keresse fel kezelőorvosát! Ha az előírtnál több Daedalon tablettát vett be, azonnal forduljon orvoshoz!

### **Hogyan tároljuk a Daedalon tablettát?**

Szobahőmérsékleten (15–30 °C-on) kell tartani.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

## **A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni!**

### **Kérdések:**

a) Milyen problémákra használható ez a tableta?

.....

b) Orvos írja-e fel ezt a tablettát?

.....

c) Miért tüntetik fel a betegtájékoztatóban az összetevőket, amikor az emberek többsége nem ismeri ezeket az anyagokat?

.....

d) Barátnőd gyomorgörcsök miatt émelyeg, hányingere van. Ajánlanád-e neki ezt a tablettát?

.....

e) Hány napig lehet ellenőrzés nélkül szedni ezt a gyógyszert?

.....

f) A barátod húga ötéves, bevehet-e Daedalon, ha utazáskor hányingere van?

.....  
g) Terhes anyák bevehetnek-e Daedalont, ha hányingerük van? Indokold meg a válaszodat!

.....  
h) Nagymamádnak magas a vérnyomása, és az is előfordul, hogy altatóval alszik. Javasolod-e neki a Daedalont?

.....  
i) Ha a barátnőd asztmás, milyen előzmények mellett vehet be ebből a gyógyszerből, ha utazáskor szédül, és hányingere van?

.....  
j) Barátnődnek kistestvére született. Hétfvégén vidékre utaznak, az édesanyja utazáskor rendszerint rosszul érzi magát. Mire figyelmeztetnéd őt a tablettával kapcsolatban?

.....  
k) Nagybátyádéknál töltötted a napot. Este haza akar vinni autóval, de előtte bekap egy Daedalont, mert kicsit émelyeg a gyomra a délután megivott sörtől. Szívesen beülsz mellé a kocsiba? Válaszodat indokold meg!

.....  
l) A bátyád csúnyán összefejelt valakivel a focimeccsen. Néhány öltéssel össze is kellett varrni a fejét. Az agyrázkódás miatt szédül, és hányingere van. Kér tőled egy Daedalont, adhatsz-e neki?

.....  
m) Írj két olyan foglalkozást, amelyek végzőinek semmiképpen nem javasolnád a gyógyszer szedését!

.....  
n) Nagynénéd a sugárkezelés után rettentően émelyeg, segíthetsz-e rajta ezzel a gyógyszerrel? Ha igen, maximum milyen adagolással?

.....  
o) Bevehet-e egy 11 éves és 42 kg testtömegű gyerek napi 4 tablettát ebből a gyógyszerből?

.....  
p) Milyen esetben kell azonnal orvoshoz fordulni a Daedalon szedésekor?

.....  
r) Tárolhatjuk-e a tablettát a hűtőszekrényben?

.....  
s) Miért nem tanácsos eldobni a tabletták külső csomagolását?

.....